

CONTENÇÃO DE GATO PARA COLHEITA DE SANGUE

Aviso Legal: Foi desenvolvida uma série de manuais pela equipa do Laboratório de Competências Clínicas – *Clinical Skills Lab* (funcionários, recém-formados e alunos) da Faculdade de Ciências Veterinárias da Universidade de Bristol, Reino Unido.

- Cada manual exemplifica uma forma de executar uma técnica, existindo muitas vezes outras abordagens. Antes de usar os manuais, os alunos devem confirmar com a sua faculdade/docentes responsáveis, se a abordagem apresentada é aceite no seu programa ou se deve ser utilizado um método alternativo.
- Os manuais são disponibilizados de boa-fé, e podem estar sujeitos a alterações.
- Ao usar estes manuais, devem-se adotar procedimentos de trabalho seguros e fazer as suas próprias avaliações de risco, verificadas pela sua faculdade. A Universidade de Bristol não se responsabiliza por qualquer perda ou dano resultante do não cumprimento de tais práticas.

Este trabalho está sobe licença da - Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

© Universidade de Bristol, 2022

Ano do grupo: 1º ano +

Equipamento para este posto/estação:

- Modelo de Gato – Simulador *Fluffy* (instruções encontram-se na respetiva bolsa protetora)

Considerações para este posto/estação:

- Consulte "Locais de administração de injetáveis em cães e gatos CSL_D03" para mais de detalhes.

Qualquer elemento que exerça/pratique no Laboratório de Competências Clínicas deve ler a "Introdução CLS_I01" e concordar em cumprir as "Regras do CSL_I00" e "Regras da Área de Laboratório CLS_I02"

Por favor, informe o responsável se o equipamento estiver danificado ou prestes a acabar.

1



Posicione o gato na ponta da mesa de exame/marquesa, em posição sentada ou em decúbito esternal, com a cabeça voltada para o aluno que irá colher a amostra de sangue.

2



Suavemente contenha a cabeça do gato, colocando uma mão sob a sua cabeça ou pescoço.

3



Coloque a outra mão atrás do cotovelo, e estenda um pouco o membro para a frente. A intensidade da contenção deve permitir recolher uma amostra de sangue, e ao mesmo tempo consentir que o gato se sinta calmo e relaxado.

4



Use o seu braço para segurar suavemente o gato contra o seu corpo, evitando que o gato se mexa. Nesta fase, antes de realizar o garrote, deve ser feita a tricotomia e a assepsia do pelo da face dorsal do membro torácico (sobre a região da veia cefálica).

5



Use o seu polegar para fazer o garrote, colocando-o sobre a face dorsal do membro ao nível do cotovelo, rode-o ligeira e lateralmente, expondo a veia a uma melhor posição. O aluno que irá fazer a colheita da amostra, também deve segurar a extremidade distal do membro para ajudar a estabilizar.

1




Posicione o gato na ponta da mesa de exame/marquesa, em posição sentada ou em decúbito esternal, com a cabeça voltada para o aluno que irá colher a amostra de sangue.

2



Segure a cabeça do gato para cima, colocando os dedos de uma mão debaixo do queixo. Certifique-se de que os seus dedos não estão a obstruir a veia jugular.

3



Use a outra mão para segurar os membros anteriores do gato. Coloque a sua mão por baixo do corpo e atrás dos membros torácicos. Utilize os dedos para segurar os dois membros, com um dedo entre eles.

4



Use o seu braço para segurar suavemente o gato contra o seu corpo, evitando que o gato se mexa. Nesta fase, antes de realizar o garrote, deve ser feita a tricotomia e a assepsia do pelo do pescoço (sobre a região do sulco Jugular).

5



O aluno que irá recolher a amostra, deverá fazer o garrote pressionando a veia jugular perto da base do pescoço. Poderá ser solicitado ao assistente que ajuste a posição da cabeça, de forma a tornar a veia mais visível.

1. Deixe a estação pronta para o próximo aluno/docente, tal como a encontrou, arrumada, organizada e limpa.

Estação pronta para o próximo docente/aluno



Informe um docente ou responsável se o equipamento estiver danificado ou prestes a esgotar.

- Regra geral, com pacientes felinos "Menos é Mais". Quanto menor o grau de contenção necessário, melhor!
- Com um gato frágil ou esquivo, a utilização de uma toalha pode ser útil, mantendo-se o gato na mesma posição, mas enrolado numa toalha deixando a cabeça (e o membro para colheita de sangue) fora da toalha.
- Se a superfície da mesa/marquesa for escorregadia, pode ser útil colocar uma toalha na mesa e colocar o gato sobre a mesma.